CrisisPrimerosAuxilios

Qué hacer en caso de una crisis

PERMANEZCA con la persona y registre el tiempo. Mantenga la calma y revise si lleva alguna identificatión de alerta médica.

Mentenga a la persona SEGURA. Aleje a la persona de *objetos peligrosos.*



Acueste a la persona de LADO si no está despierta y consciente. No obstruir las vías respiratorias, coloque algo pequeño y suave bajo la cabeza, afloje cualquier ropa ajustada alrededor del cuello.

4

NO le ponga *nada* en la boca. No le dé agua, comida ni pastillas hasta que esté despierta.



NO le sujete.



6

PERMANEZCA con la persona hasta que esté despierta y alerta después de la convulsión.

La mayoría de las crisis terminan en pocos minutos.



- ▲ La convulsión dura más de 5 minutos
- ▲ La persona tiene una convulsión tras otra
- ▲ Hay dificultad para respirar
- ▲ Las crisis ocurren en el agua

- ▲ La persona está lesionada, embarazada o enferma
- ▲ La persona no vualve a su estado habitual
- ▲ Es primera vez que presenta crisis

Descargo de responsabilidad: esta publicación está diseñada para proporcionar al público información general sobre la epilepsia y las crisis. No pretende dar consejo médico específico. Las personas con epilepsia no deben realizar cambios en su tratamiento o actividades basados en esta información sin consultar primero con su proveedor de atención médica. Esta publicación es posible gracias al financiamiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, pro sus siglas en inglés) bajo el acuerdo de subvención cooperative numero 1N58DP006256-03-00. Sus contenidos son responsabilidad exclusiva de la Fundación de Epilepsia y no representan necesariamente los puntos de vista de los CDC.

